

## NEMAVET VET 50 MG/G JAUHE KOIRILLE

Nemavet-jauhe on laajakirjainen matoläläke, joka on tarkoitettu koiran sisäloisten häätämiseen. Valmisteen sisältämä fenbendatsoli tehoaa koiran ruoansulatuskanavassa loisiviin suolinkaisiin, hakamatoihin ja piiskamatoihin ja niiden toukkiin sekä *Tænia*-suvun heisimatoihin.

**Koostumus:** 1 gramma jauhetta sisältää vaikuttavaa ainetta fenbendatsolia 50 mg sekä lisäksi laktoosimonohydraattia 949 mg ja kolloidista, vedetöntä piidioksidia 1 mg.

**Annostus ja antotapa:** Ohjeannos on 1 g Nemavetia (50 mg fenbendatsolia) elopainokiloa kohti kerran päivässä ruokaan sekoitettuna 3-5 päivän ajan loisesta riippuen. Suolinkaisiin kohdistuvassa loishäädössä riittää 3 päivän hoito. Pakkaus sisältää 5 g mittalusikan. 1 tasainen mittalusikallinen (5 g) Nemavet-jauhetta on 5 kg koiran kerta-annos.

### Hoitosuositus:

**Kantavat nartut:** Suolinkais- ja hakamatotartunnan ennaltaehkäisemiseksi vastasyntyneillä pennuilla voidaan kantavalle nartulle antaa päivittäinen lääkeannos tiineyden 40.-42. päivästä alkaen synnytykseen saakka ja siitä 2 viikkoa eteenpäin. Säännöllisesti pennusta asti lääkityn nartun loishäätöön riittää yksi 3 päivän Nemavet-kuuri 40.-42. tiineyspäivästä alkaen. Synnytyksen jälkeen narttu lääkitään yhtä aikaa pentujen kanssa 3 ja 5 viikkoa synnytyksestä. Hoidon kesto on 3 päivää molemmilla kerroilla.

**Pennut:** Suolinkaistartunnan ehkäisemiseksi pennut lääkitään kahdesti 3 päivän mittaisella hoidolla 3 ja 5 viikon ikäisinä.

**Muut koirat:** Aikuisen eläimen loishäädön tarpeellisuus tulisi aina punnita huomioiden koiran elintavat, oireet sekä ulostetutkimuksen tulokset. Tapauskohtaisesti eläinlääkärin ohjeiden mukaan rutiininomainen tiuhempi loishäätö. Hoitoaika 3-5 vuorokautta.

**Lääkkeen antaminen pennuille:** Esimerkki: 5 pentua, joiden kunkin paino on 1 kg:  
1 mittalusikallinen = 5 g jauhetta lisätään pennuille tarkoitetun ruuan joukkoon ja sekoitetaan hyvin.

**Haittavaikutukset:** Fenbendatsoli-hoidon aikana voi joskus esiintyä oksentelua, syömättömyyttä ja vatsavaivoja. Yleensä sekä aikuiset koirat että pennut sietävät fenbendatsolia hyvin. Pennuilla, joille annettiin viisinkertainen annos (=250 mg/kg) ohjeannokseen nähden 6 päivän ajan, ei todettu haittavaikutuksia. Valmisteen sisältämä laktoosi saattaa aiheuttaa aikuiselle koiralle (yli 4 kk) ripulin, erityisesti ohjeannosta suurempina annoksina (Nemavet-annos yli 1,6 kertainen eli noin 16 g/10 kg = yli 3 mittalusikallista/10 kg).

**Milloin Nemavet-jauhetta ei tule käyttää?** Koska valmisteen sisältämä laktoosi saattaa joillakin yksilöillä pahentaa ripulia, valmistetta tulee käyttää varoen aikuisilla koirilla, joilla on ripulioireita.

**Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana:** Valmisteen vaikutusta sikiöön alkutiineyden aikana ei koiralla ole tutkittu. Tämän vuoksi valmisteen käyttöä ei suositella tiineyden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana. Valmistetta voidaan käyttää tiineyden viimeisen kolmanneksen sekä laktaation aikana.

**Varoitukset lääkkeen antajalle:** Käytön jälkeen tulee pestä kädet sekä muut ihoalueet, jotka ovat olleet tuotteen kanssa kosketuksissa.

**Säilytys ja kestoaika:** Ei lasten ulottuville. Säilytys huoneenlämmössä (+15-25 °C), kuivassa paikassa, hyvin suljetussa astiassa, valolta suojassa. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty purkin etikettiin, valmistetta ei tule käyttää tämän ajankohdan jälkeen. Käyttämätön valmiste tulee toimittaa apteekkiin hävitettäväksi.

**Myyntiluvan haltija ja valmistaja:** Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irlanti.

**Tiedotus ja markkinointi Suomessa:** Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo.

**Pakkauselosteen päiväys:** 20.11.2008

## NEMAVET VET 50 MG/G PULVER FÖR HUNDAR

Nemavet-pulver är ett bredspektrum anthelmintikum för behandling av infektioner orsakade av inälvparasiter hos hund. Fenbendazol, som preparatet innehåller, är effektivt mot spolmask, hakmask och piskmask i mag-tarmkanalen inklusive deras larvstadier samt mot bandmask av släktet *Tænia*.

**Innehåll:** 1 gram pulver innehåller 50 mg fenbendazol som verksamt substans samt därtill 949 mg laktosmonohydrat och kolloidal, vattenfri kiseldioxid 1 mg.

**Dosering och administreringssätt:** Normaldosen är 1 g Nemavet (50 mg fenbendazol) per kg kroppsvikt en gång i dagen inblandat i fodret. Behandlingstiden beror på parasitens art och är 3-5 dagar. Avmaskning mot spolmask räcker det med tre dagars medicinering. Förpackningen innehåller en 5 g:s doseringssked. En struken doseringssked (5 g) Nemavet-pulver utgör dosen för en 5 kg:s hund.

### Behandlingsrekommendation:

**Dräktiga tikar:** För förebyggande av spolmask- och hakmaskinfektion hos nyfödda valpar kan den dräktiga tiken ges en normaldos dagligen, från och med dräktighetens 40:e-42:a dag till 2 veckor efter valpning. Om tiken sedan valp regelbundet blivit avmaskad räcker det med en tre dagars behandling från och med dräktighetens 40:e-42:a dag. Tiken avmaskas tillsammans med valparna vid 3 och 5 veckor efter valpningen. Behandlingstiden är 3 dagar åt gången.

**Valpar:** För att förebygga spolmaskinfektion avmaskas valparna två gånger under tre konsekutiva dagar vid tre och fem veckors ålder.

**Övriga hundar:** Ett fullvuxet djurs behov av behandling mot parasiter bör alltid avvägas genom att beakta hundens levnadsvårer, symptom och resultaten av undersökningar på avföring. I enskilda fall kan behandling appliceras oftare enligt veterinärens rekommendationer. Behandlingstid är 3-5 dygn.

**Administrering av preparatet till valpar:** Exempel: 5 valpar av vilka var och en väger 1 kg: 1 måttsked = 5 g pulver inblandas väl i valparnas mat.

**Biverkningar:** Under fenbendazol behandling kan kräkningar, fodervägran och magtarmkanalsproblem tidvis uppstå. I allmänhet tolererar både fullvuxna hundar och valpar fenbendazol väl. Vid en överdosering hos valpar med fem gånger normaldos (=250 mg/kg) under sex dagars tid kunde inga biverkningar konstateras. Laktoset, som preparatet innehåller, kan hos fullvuxen hund (över 4 mån.) försäkra diarré speciellt vid högre doser än riktdosen (Nemavet dosen större än 1,6 ggr dvs. ca 16 g/10 kg = över 3 måttskedar/10 kg).

**När skall man inte använda Nemavet pulver?** Preparatets laktos kan förvärra diarré hos en del individer. Om diarrésymptomen förekommer hos fullvuxna hundar bör preparatet användas försiktigt.

**Användning under dräktighet och laktation:** Preparatets inverkan på hundfoster under tidig dräktighet har inte undersökts. Därför rekommenderas inte användning av läkemedlet under dräktighetens första och andra tredjedel. Läkemedlet kan användas under dräktighetens sista tredjedel och under digivningen.

**Varningar för givande av läkemedel:** Efter användning bör man tvätta händerna samt övriga hudområden som har kommit i kontakt med preparatet.

**Förvaring och hållbarhet:** Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i tätt sluten förpackning i rumstemperatur (+15-25 °C), på torrt ställe, skyddad mot ljus. Utgångsdatum har antecknats på burkens etikett, preparatet bör inte användas efter detta datum. Oanvänt preparat bör inlämnas till apotek för förstöring.

**Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:** Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irland.

**Information och marknadsföring i Finland:** Vetcare Oy, PB 99, 24101 Salo.

**Bipacksedelns datum:** 20.11.2008

