

Flexadin®

Advanced

UC-II

Ainutlaatuinen vaikutusmekanismi

- ✓ Nivelrikossa elimistön omat puolustus-solut hyökkäävät nivelten omia soluja vastaan.
- ✓ Flexadin® Advanced:n ainutlaatuinen vaikutusmekanismi hillitsee tätä hyökkäystä.*
- ✓ Yksi maistuva makunappula kerran päivässä kaikenkokoisille koirille.
- ✓ Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi Flexadin® Advanced:a tulee käyttää vähintään kolmen kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Suositellaan säännölliseen käyttöön.
- ✓ Tutkimusten mukaan glukosamiini- ja kondroitiini-sulfaattivalmisteiden yhtäaikainen käyttö heikentää Flexadin® Advanced:n vaikutusta.**

Pakkaukset:
30 tabl.
60 tabl.



vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
lemminkotiapteekki.fi
facebook.com/Vetcarefinland



11.2017

ETUSIJALLA ELÄINTEN HYVINVOINTI

Koostumus: glyseroli, hiiva, kaurajauho, rehuruisjauho, kaurahiutale, kananmaksajauhe, pellavansiemenöljy, UCII: kananrustojauhe (sisältää kaliumkloridia: 0,44%, kokonaiskollageeni: 0,36% (sisältää denaturoimatonta kollageeni tyyppi II)) 1,47%, kalaöljy (EPA:n lähde), pektiini, sakkaroosi, maltodekstriini, kalsiumsulfaattidihydraatti, polyetyylenglykoli.

Lisäaineet/1 kg: Emulgointi -ja stabilointiaineet, sakeuttamis- ja hyytelöintiaineet: akaasia (arabikumi) E414 50 000 mg, natriumalginaatti E401 250 mg; vitamiinit ja provitamiinit: E-vitamiini/all-rac-alfatokoferoliasetaatti (3a700) 7000 IU; säilöntäaineet: antioksidantit; aromiainesekoite.

Ravintoaineet: Kosteus 20%, raakavalkuainen 15%, raakasva 9%, tuhka 3%, raakakuitu 1,5%.

Yhdessä purutabletissa: Omega-3 rasvahappojen kokonaismäärä 95 mg, eikosapentaenihapon (EPA) kokonaismäärä 9,3 mg, E-vitamiinin kokonaismäärä 21 IU, yhden purutabletin paino: 3 g. Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä. Purutabletit voidaan antaa suoraan makupalana tai ruoan joukossa. Tuotetta tulee käyttää noudattaen ravintosuosituksia. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.

ANNOSTELU	Koiran koko	Makutabletti päivässä
	Kaikenkokoisille koirille	1

Nivelten aineenvaihdunnan tukeminen nivelrikon yhteydessä. Sisältää UCII® (40 mg/purutabletti), jossa on denaturoimatonta kollageenityyppiä II. Tyyppi II kollageeni on tärkeä osa rustoa. Sisältää omega-3 rasvahappoja, jotka tukevat nivelruston terveyttä ja E-vitamiinia sen voimakkaan antioksidanttivaikutuksen ansiosta. Ihanteellisen tuloksen saavuttamiseksi, yhdistä Flexadin tasapainotettuun koiran täysruokaan.

Säilytys: Säilytetään huolellisesti suljetussa pakkauksessa alle 25°C lämpötilassa kuivassa paikassa suojattuna auringonvalolta. Vain eläimille. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Pakkauskoost:** 30 purutablettia (90 g netto) ja 60 purutablettia (180 g netto).

*Oraalitoleranssissa säännöllisesti suun kautta saadulla antigeenillä totutetaan suoliston puolustusjärjestelmän solut antigeeniin ja näin sammutetaan vähitellen immuunipuolustuksen solujen reagointi kollageenia vastaan muualla elimistössä.

** R. C. Gupta et al: Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UC-II), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition* 96: 770-777, 2012.

R.S. Gupta et al: Therapeutic efficacy of undenatured type-II collagen (UC-II) in comparison to glucosamine and chondroitin in arthritic horses *J. vet. Pharmacol. Therap.* 32: 577-584, 2009.