

# Flexadin® Advanced

Ainutlaatuinen vaikutusmekanismi **UC-II**

- ✓ Nivelrikossa elimistön omat puolustussolut hyökkäävät nivelten omia soluja vastaan.
- ✓ Flexadin® Advanced:n (UC-II) ainutlaatuinen vaikutusmekanismi hillitsee tätä hyökkäystä.\*
- ✓ Yksi maistuva makunappula kerran päivässä kaikenkokoisille koirille.
- ✓ Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi Flexadin® Advanced:a tulee käyttää vähintään kolmen kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Suositellaan säännölliseen käyttöön.
- ✓ Tutkimusten mukaan glukosamiini- ja kondroitiini-sulfaattivalmisteiden yhtäaikainen käyttö heikentää Flexadin® Advanced:n vaikutusta.\*\*

Pakkaukset:  
30 tabl.  
60 tabl.



[vetcare@vetcare.fi](mailto:vetcare@vetcare.fi)  
[vetcare.fi](http://vetcare.fi)  
[lemmikinkotiapteekki.fi](http://lemmikinkotiapteekki.fi)  
[facebook.com/Vetcarefinland](https://www.facebook.com/Vetcarefinland)



**Koostumus:** glyseroli, hiiva, kaurajauho, rehuruisjauho, kaurahiutale, kananmaksajauhe, pellavansiemenöljy, UCII: kananrustojauhe (sisältää kaliumkloridia: 0,44%, kokonaiskollageeni: 0,36% (sisältää denaturoimatonta kollageeni tyyppi II)) 1,47%, kalaöljy (EPA:n lähde), pektiini, sakkaroosi, maltodekstriini, kalsiumsulfaattidihydraatti, polyetyylenglykoli.

**Lisäaineet/1 kg:** Emulgointi -ja stabilointiaineet, sakeuttamis- ja hyytelöintiaineet: akaasia (arabikumi) E414 50 000 mg, natriumalgiinaatti E401 250 mg; vitamiinit ja provitamiinit: E-vitamiini/all-rac-alfatokoferoliasetaatti (3a700) 7000 IU; säilöntäaineet: antioksidantit; aromiainesekoite.

**Ravintoaineet:** Kosteus 20%, raakavalkuainen 15%, raakarasva 9%, tuhka 3%, raakakuitu 1,5%.

Yhdessä purutabletissa: Omega-3 rasvahappojen kokonaismäärä 95 mg, eikosapentaenihapon (EPA) kokonaismäärä 9,3 mg, E-vitamiinin kokonaismäärä 21 IU, yhden purutabletin paino: 3 g. Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä. Purutabletit voidaan antaa suoraan makupalana tai ruoan joukossa. Tuotetta tulee käyttää noudattaen ravintosuosituksia. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.

| ANNOSTELU | Koiran koko               | Makutabletti päivässä |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
|           | Kaikenkokoisille koirille | 1                     |

Nivelten aineenvaihdunnan tukeminen nivelrikon yhteydessä. Sisältää UCII® (40 mg/purutabletti), jossa on denaturoimatonta kollageenityyppiä II. Tyyppi II kollageeni on tärkeä osa rustoa. Sisältää omega-3 rasvahappoja, jotka tukevat nivelruston terveyttä ja E-vitamiinia sen voimakkaan antioksidanttivaikutuksen ansiosta. Ihanteellisen tuloksen saavuttamiseksi, yhdistä Flexadin tasapainotettuun koiran täysruokaan.

**Säilytys:** Säilytetään huolellisesti suljetussa pakkauksessa alle 25°C lämpötilassa kuivassa paikassa suojattuna auringonvalolta. Vain eläimille. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. **Pakkauskoot:** 30 purutablettia (90 g netto) ja 60 purutablettia (180 g netto).

\*Oraalitoleranssissa säännöllisesti suun kautta saadulla antigeenillä totutetaan suoliston puolustusjärjestelmän solut antigeeniin ja näin sammutetaan vähitellen immuunipuolustuksen solujen reagointi kollageenia vastaan muualla elimistössä.

\*\* R. C. Gupta et al: Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UC-II), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition* 96: 770-777, 2012.

R.S. Gupta et al: Therapeutic efficacy of undenatured type-II collagen (UC-II) in comparison to glucosamine and chondroitin in arthritic horses *J. vet. Pharmacol. Therap.* 32: 577-584, 2009.