


# FRONTLINE<sup>®</sup> VET

Fiproniili

Tippa, joka tappaa puutiaiset sekä aikuiset kirput ja väiveet.



# FRONTLINE COMP

Fiproniili, (S)-metopreeni

Tippa, joka tappaa myös kirppujen ja väiveiden varhaisemmat muodot.



Koirille | Kissoille

Koirille | Kissoille | Freteille

## FRONTLINE VET ANNOSTELU

Koira	0,67 ml	1,34 ml	2,68 ml
2-10 kg	1 pipetti		
10-20 kg		1 pipetti	
20-40 kg			1 pipetti
Kissa	1 pipetti à 0,5 ml		

HELPPO ANNOSTELLA!

## FRONTLINE COMP ANNOSTELU

Koira	0,67 ml	1,34 ml	2,68 ml	4,02 ml
2-10 kg	1 pipetti			
10-20 kg		1 pipetti		
20-40 kg			1 pipetti	
>40 kg				1 pipetti
Kissa ja fretti	1 pipetti à 0,5 ml			

## Toimi näin



1. Katkaise pipetin kärki.



2. Liuos annostellaan lapaluiden väliin. Vedä karvoja sivuun siten, että näet ihon.



3. On tärkeää, pusertaa suurin osa liuksesta suoraan iholle. Koiralle koko liuosmäärä voidaan laittaa yhteen kohtaan. Kissalle pipetin sisältö jaetaan kahteen kohtaan ihoa.

## Frontline Vet 100 mg/ml paikallisvaleyliuos ja 2,5 mg/ml sumute iholle

**Vaikuttava aine:** Fiproniili. **Kohde-eläinlajit:** Koira ja kissa. **Käyttöaiheet:** Koiran ja kissan kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoito ja häätö. Koiran täiden häätö. **Annostus ja antotapa:** Ulkoiseen käyttöön. Annostellaan iholle. Katso tarkemmat ohjeet käsittelyvälineistä ja annostuksesta pakkauselosteesta. Lääke annetaan alueelle, josta eläin ei pysty nuolemaan sitä pois. Sumutteella kastellaan koko turkki, minkä jälkeen eläintä estetään nuolemasta turkkia. Eläimet eivät saa nuolla toisiaan hoidon jälkeen. **Vasta-aiheet:** Alle 8-viikkoiset koirat ja kissat. Sairaita tai sairaudesta toipuvia eläimiä ei saa hoitaa. Ei saa käyttää kaneille. Kissalle ei saa käyttää koirille tarkoitettuja pipettejä, koska tästä voi aiheutua yliannostus. **Erityisvaroitukset:** Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkauselosteesta. **Haittavaikutukset:** Älä yliannostele. Haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä: paikallisia ihoreaktioita antokohdassa, hyperalivaatiota, ohimeneviä neurologisia oireita, oksentelua tai hengitysvaikeuksia. Ks. tarkemmin pakkauselosteesta. **Tiineys ja laktaatio:** Frontline vet sumute valmistetta ei saa käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Frontline vet paikallisvaleyliuos: Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. **Pakkaukset:** Frontline vet paikallisvaleyliuos: 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml ja 4 x 2,68 ml, sumute: 100 ml ja 250 ml. **Myyntiluvan haltija:** Boehringer Ingelheim Animal Health, Tanska. **Markkinoija:** Vetcare Finland Oy, vetcare.fi. **TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.**

## Frontline Comp paikallisvaleyliuos

**Vaikuttavat aineet:** Fiproniili ja (S)-metopreeni. **Kohde-eläinlajit:** Kissa, koira ja fretti. **Käyttöaiheet:** **Kissa:** Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 4 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 6 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten häätöön. Valmisteen akarisidinen vaikutus puutiaisia vastaan kestää 2 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. **Koira:** Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu-, puutiais- ja / tai väivetartuntojen hoitoon. Kirppujen häätöön. Insektisidinen vaikutus uusia kirpputartuntoja (aikuismuodot) vastaan kestää 8 viikkoa. Ehkäisee kirppujen lisääntymistä estämällä munien kehittymistä (ovisidinen vaikutus) sekä toukkien ja koteloiden kehittymistä jo munituista munista (larvisidinen vaikutus) 8 viikon ajan annostuksesta. Puutiaisten vaikutus puutiaisia vastaan kestää 4 viikkoa (kokeellisten tutkimusten perusteella). Väiveiden häätöön. **Fretti:** Kirpputartuntojen tai samanaikaisten kirppu- ja puutiaistartuntojen hoito ja häätö. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää alle 8 viikkoisille ja / tai alle 1 kg painaville kissoille. Ei saa käyttää alle 8-viikkoisille ja / tai alle 2 kg painaville koirille. Ei saa käyttää sairaille tai sairaudesta toipuville eläimille. Ei saa käyttää kaneille, koska haittavaikutuksia, joihin liittyy jopa kuolleisuutta, voi esiintyä. Koirien valmistetta ei saa käyttää kissoille. **Erityisvaroitukset:** Eläintä ei saa kylvettää/kastella 48 tuntiin annoksen jälkeen, ks. tarkemmat ohjeet pakkauselosteesta. **Haittavaikutukset:** Ovat hyvin harvinaisia. Antokohdan paikallisia ohimeneviä ihoreaktioita (hilseily, värjäntymistä, paikallista karvanlähtöä, kutinaa ja punoitusta) sekä yleistä kutinaa on esiintynyt käytön jälkeen. Runsasta syljeneritystä, ohimeneviä hermostollisia oireita (tuntoherkkyttä, masenusta) tai oksentelua tai hengitysoireita on myös esiintynyt käytön jälkeen. Älä yliannostele. **Pakkaukset:** **Kissa:** 3 x 0,5 ml. **Koira:** 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml ja 3 x 4,02 ml. **Myyntiluvan haltija:** Boehringer Ingelheim Animal Health, Tanska. **Markkinoija:** Vetcare Finland Oy, Helsinki, vetcare.fi. **TUTUSTU HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTEESEEN ENNEN LÄÄKKEEN KÄYTTÖÄ.**



vetcare@vetcare.fi  
vetcare.fi



Boehringer  
Ingelheim