




FRONTLINE[®] VET

Fipronil

Droppar som stoppar fästingar samt vuxna loppor och löss.



FRONTLINE COMP

Fipronil, (S)-metopren

Droppar som stoppar även tidigare faser av loppor och löss



Hund / Katt

FRONTLINE VET DOSERING

Hund	0,67 ml	1,34 ml	2,68 ml
2-10 kg	1 pipett		
10-20 kg		1 pipett	
20-40 kg			1 pipett
Katt	1 pipett à 0,5 ml		

ENKEL DOSERING!

Hund / Katt / Iller

FRONTLINE COMP DOSERING

Hund	0,67 ml	1,34 ml	2,68 ml	4,02 ml
2-10 kg	1 pipett			
10-20 kg		1 pipett		
20-40 kg			1 pipett	
>40 kg				1 pipett
Katt och iller	1 pipett à 0,5 ml			

Gör så här



1. Bryt spetsen på pipetten.



2. Lösningen doseras mellan skulderbladen. Dra hår åt sidan tills du ser huden.



3. Det är viktigt att pressa lösningen direkt på huden. Till en hund kan man sätta hela mängden på ett ställe. Till en katt sätter man innehållet av pipetten på två ställen.

Frontline vet 100 mg/ml spot-on, lösning och 2,5 mg/ml kutan spray

Aktiv substans: Fipronil. **Djurslag:** Hund och katt. **Indikationer:** Förebyggande och behandling av loppor eller samtidig förekomst av loppor, fästingar och/eller löss hos hund och katt. **Dosering och administreringsätt:** För utvärtes bruk. Doseras på huden. Se närmare instruktioner gällande dosering och administrering i bipacksedeln. Spot-on-lösningen ska appliceras på ett område som djuret inte kommer åt att slicka. Vid bruk av spray ska hela pälsen våtas och djuret sedan hindras från att slicka sig. Djur får inte komma åt att slicka varandra efter administreringen.

Kontraindikationer: Valpar och kattungar yngre än 8 veckor. Sjuka djur eller djur under konvalescens. Ej för kaniner. Pipetter avsedda för hundar får inte användas till katter, eftersom detta kan leda till överdosering. **Särskilda varningar:** Djuret får inte badas/våtas inom 48 timmar efter doseringen. För närmare instruktioner, se bipacksedeln. **Biverkningar:** Överdosa inte. Biverkningar är sällsynta eller mycket sällsynta. Följande biverkningar kan förekomma: lokala hudreaktioner vid administreringsstället, hypersalivering, reversibla neurologiska symtom, kräkningar eller andningssvårigheter. Se närmare information i bipacksedeln. **Dräktighet och digivning:** Frontline vet spray får inte användas under dräktighet och digivning. Frontline vet spot-on kan användas under dräktighet och digivning.

Förpackningar: Frontline vet spot-on lösning: 4 x 0,5 ml, 4 x 0,67 ml, 4 x 1,34 ml och 4 x 2,68 ml; spray: 100 ml och 250 ml. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Boehringer Ingelheim Animal Health, Danmark. **Marknadsförs av:** Vetcare Finland Oy, vetcare.fi. **LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN FÖRE BRUK.**

Frontline Comp spot-on, lösning

Aktiva substanser: Fipronil och (S)-metopren. **Djurslag:** Katt, hund och iller. **Indikationer:** Katt: Behandling av loppor eller av samtidig förekomst av loppor, fästingar och/eller pälsätande löss. För behandling av loppor: Den insekticida effekten mot nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 4 veckor. Förebygger loppornas förökning i 6 veckor efter administreringen av läkemedlet genom en hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt) samt av utvecklingen av larver och puppor (larvicid effekt) ur ägg som redan lagts. För behandling av fästingar: Den acaricida effekten mot fästingar kvarstår i 2 veckor (på basen av experimentella data). Behandling av pälsätande löss. Hund: Behandling av loppor eller av samtidig förekomst av loppor, fästingar och/eller pälsätande löss. För behandling av loppor: Den insekticida effekten mot nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 8 veckor. Förebygger loppornas förökning i 8 veckor efter administreringen av läkemedlet genom en hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt) samt av utvecklingen av larver och puppor (larvicid effekt) ur ägg som redan lagts. För behandling av fästingar: Den acaricida effekten mot fästingar kvarstår i 4 veckor (på basen av experimentella data). Behandling av pälsätande löss. Iller: Behandling av loppor eller av samtidig förekomst av loppor och fästingar. **Kontraindikationer:** Katter yngre än 8 veckor och/eller med en vikt på mindre än 1 kg. Hundar yngre än 8 veckor och/eller med en vikt på mindre än 2 kg. Sjuka djur eller djur under konvalescens. Ej för kaniner, eftersom biverkningar, inklusive dödsfall, kan uppstå. Preparat avsett för hundar får inte användas till katter. **Särskilda varningar:** Djuret får inte badas/våtas inom 48 timmar efter doseringen. För närmare instruktioner, se bipacksedeln. **Biverkningar:** Biverkningar är mycket sällsynta. Lokala, reversibla hudreaktioner vid administreringsstället (fjällning, missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda eller hudrodnad) samt generell klåda har förekommit. Hypersalivering, reversibla neurologiska symtom (ökad känslighet för stimulering, depression) eller kräkningar och respiratoriska symtom har också förekommit. Överdosa inte. **Förpackningar:** Katt: 3 x 0,5 ml. Hund: 3 x 0,67 ml, 3 x 1,34 ml, 3 x 2,68 ml och 3 x 4,02 ml. **Innehavare av godkännande för försäljning:** Boehringer Ingelheim Animal Health, Danmark. **Marknadsförs av:** Vetcare Finland Oy, Helsingfors, vetcare.fi. **LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN FÖRE BRUK.**



vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi

